

PIPP (Premature infant pain profile)

Para utilizar la Tabla de Score: cada ítem tiene una puntuación, por ejemplo en edad gestacional 36 semanas será 0 y 28 será 3, igual los otros como estado de conducta, etc.

<u>PROCESO</u>	<u>INDICADOR</u>	0	1	2	3
	Edad Gestacional	36 semanas o más	32-35 semanas + 6 días	28-31 semanas + 6 días	28 semanas o menos
Observar durante 15 segundos	Estado conducta	Despierto/Activo Ojos abiertos Movimientos faciales	Despierto/Quieto Ojos abiertos No movimientos faciales	Dormido/Activo Ojos cerrados Movimientos faciales	Dormido/Quieto Ojos cerrados No movimientos faciales
Observar durante 30 segundos	Frecuencia cardiaca Máx.	Aumento 0-4 latidos/minuto	Aumento 5-14 latidos/minuto	Aumento 15-24 latidos/minuto	Aumento de 25 ó más latidos/minuto
	Saturación Oxígeno Min	Disminución 0-2.4 %	Disminución 2.5-4.9 %	Disminución 5-7.4 %	Disminución de más de 7.5 %
	Cejas fruncidas	No 0-3 segundos	Mínimo > 3-12 segundos	Moderado >12-21 segundos	Máximo > 21-30 segundos
	Ojos apretados	No 0-3 segundos	Mínimo > 3-12 segundos	Moderado >12-21 segundos	Máximo > 21-30 segundos
	Surco naso labial	No 0-3 segundos	Mínimo > 3-12 segundos	Moderado >12-21 segundos	Máximo > 21-30 segundos

SCORE 0-6. NO DOLOR: Si al niño se le hace algún procedimiento (venopunción, punción talón, etc.) valorar de nuevo.

SCORE 7-12: INICIAR MÉDIDAS DE CONFORT (chupete, música, arroparlo), valorar en una hora. Si después de la hora el score sigue siendo 7-12, dar Paracetamol (anotado en órdenes). Valorar en una hora, si sigue con el mismo score puede ser que el Paracetamol sea inefectivo o inapropiado, poner en ordenes Fentanilo o Morfina, valorar a los 30 minutos.

SCORE 13-21: ANALGESIA NARCOTICA.